



ČR – ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ,
organizační složka státu
SEKCE ZEMĚDĚLSKÝCH VSTUPŮ
ODBOR PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN
Korespondenční adresa: Zemědělská 1a, 613 00 BRNO

VYTVOŘIL/TELEFON: Ing. Eva Boušková /545 110 407
E-MAIL: eva.bouskova@ukzuz.cz

DATUM: 26. 3. 2019

1. Označení přípravku podle nařízení Komise (EU) č. 547/2011:

a) Požadavek na označování štítku dle přílohy I odst. 1 písm. l) nařízení Komise (EU) č. 547/2011, opatření k minimalizaci pravděpodobnosti vývoje rezistence:

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek stále po sobě bez přerušení ošetřením jiným insekticidem s odlišným mechanismem účinku.

b) Požadavek na označování štítku uvedený v příloze I odst. 1 písm. n) nařízení Komise (EU) č. 547/2011, je-li přiložen příbalový leták:

SPo5 Před opětovným vstupem ošetřené skleníky důkladně vyvětrejte.

c) Požadavek na označování štítku uvedený v příloze I odst. 1 písm. p) nařízení Komise (EU) č. 547/2011, je-li přiložen příbalový leták:

Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.

d) Informace ke skladování přípravku podle přílohy I odst. 1 písm. q) a r) nařízení Komise (EU) č. 547/2011:

Doba použitelnosti: 2 roky od data výroby, teplota skladování + 5 °C až + 30 °C.

e) Standardní věty udávající bezpečnostní opatření pro ochranu lidského zdraví, zdraví zvířat nebo životního prostředí, uvedené v příloze III nařízení Komise (EU) č. 547/2011:

i. Obecná ustanovení

SP 1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchových vod/Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a cest).

2. Další omezení dle § 34 odst. 1 zákona č. 326/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů:

Při aplikaci přípravku nesmí dojít k zasažení vodních ploch z důvodu rizika pro vodní organismy.

Přípravek neaplikujte ve sklenících, kde je používána biologická ochrana.

Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, ve směru po větru a od dalších osob.

Riziko, které představuje přípravek pro uživatele, je přijatelné, pokud celková doba práce s přípravkem nepřesáhne 30 min. během jednoho dne.

Po ukončení práce ve skleníku/fóliovníku opusťte ošetřované prostory!

Další práce lze provádět až po důkladném oschnutí ošetřených rostlin.

Ucpané trysky postřikovače se nesmějí profukovat ústy.

Při přípravě aplikační kapaliny ani při provádění postřiku nepoužívejte kontaktní čočky.

Práce s přípravkem je nevhodná pro alergické osoby.

3. Rozsah povoleného použití:

SUBSTRAL CAREO Ultra - Koncentrát proti škůdcům

1) Plodina, oblast použití	2) Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, mísitelnost	OL	3) Poznámka
okrasné rostliny skleníkové	molice, třásněnky, mšice, svilušky, červci, štítenkovití, nosatci, pilatky, vrtalky	10 ml /1 l vody	AT	3) od začátku výskytu, max. 3x, při výšce rostlin do 50 cm - stačí na 16,7 m ² , při výšce rostlin 50 - 125 cm - stačí na 11,1 m ² , při výšce rostlin nad 125 cm - stačí na 8,3 m ²
okrasné rostliny venkovní	molice, třásněnky, mšice, svilušky, červci, štítenkovití, nosatci, pilatky, vrtalky	5 ml /0,5 l vody	AT	3) od začátku výskytu, max. 3x, při výšce rostlin do 50 cm - stačí na 8,4 m ² , při výšce rostlin 50 - 125 cm - stačí na 5,6 m ²
baklažán - skleník, paprika - skleník, rajče - skleník	mšice, molice	5 ml/0,5 l vody /8,3 m ² – při výšce rostlin do 50 cm; 10 ml/1 l vody /11,1 m ² – při výšce rostlin 50 - 125 cm; 15 ml/1,5 l vody /12,5 m ² – při výšce rostlin nad 125 cm	3	3) od začátku výskytu, max. 2x, v intervalu 10 dnů
salát - venkovní prostory	mšice	5 ml/0,5 l vody /10 m ²	3	3) od začátku výskytu, max. 2x, v intervalu 5 dnů
brambor	mandelinka bramborová	5 ml/0,5 l vody /10 m ²	14	3) od začátku výskytu, max. 2x, v intervalu 10 dnů

AT – jde o způsob použití nebo určení, které stanovení ochranné lhůty nevyžadují.

OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem poslední aplikace a sklizní.

Před ošetřením okrasných rostlin ověřte citlivost na menším počtu rostlin / menší ploše.

Přípravek se aplikuje postřikem.